

## Maladie Inflammatoire Chronique de l'Intestin (MICI)

### Qu'est-ce que c'est :

C'est une pathologie chronique due à une dérégulation du système immunitaire intestinal. Elle entraîne une inflammation et donc un épaissement et une infiltration de la muqueuse de l'intestin par des cellules inflammatoires. Comme le tube digestif est épaissi, il ne peut plus absorber correctement les nutriments et le transit s'accélère.

L'intensité des symptômes diffère largement d'un animal à l'autre, allant de vomissements et/ou de diarrhée légère à une perte de poids importante avec parfois une accumulation de liquide dans l'abdomen. Cette maladie s'apparente à la maladie de Crohn chez l'humain.



### Les signes cliniques :

Les principaux symptômes pouvant être présents sont :

- une diarrhée chronique
- une perte de poids et des troubles de l'appétit
- des vomissements chroniques et/ou intermittents
- du sang ou du mucus dans les selles

Pour établir le diagnostic, il est nécessaire d'effectuer une échographie abdominale (+/- biopsie), un bilan sanguin de malabsorption / mal-digestion et d'effectuer un régime d'éviction.

### Le traitement :

Il consiste en la mise en place d'un régime spécifique hyperdigestible ou hypoallergénique. Il est primordial d'insister sur le fait que l'animal n'aura accès à aucun autre aliment.

Parfois, des antibiotiques sont prescrits afin d'éviter la surprolifération bactérienne intestinale secondaire à la maladie intestinale chronique.

Une supplémentation en vitamine B12 peut être indiquée suivant les résultats de la prise de sang. Celle-ci est d'autant plus importante qu'un manque de vitamine B12 est un facteur de non-réponse au traitement des maladies inflammatoires chroniques.

Enfin sur certains cas, une corticothérapie est nécessaire pour traiter la MICI.

### En pratique :

Cette maladie n'est généralement pas mortelle. Ce n'est pas une maladie curable, par conséquent, le but du traitement est de réduire au minimum la fréquence des vomissements et des diarrhées : il est rare de pouvoir arrêter complètement les signes cliniques.

La plupart des chiens et des chats sont capables de vivre avec une bonne qualité de vie après un diagnostic de MICI.